


Revitalizace svahů na Letné probíhá necelých 10 let. Za tu dobu byly nepůvodní dřeviny přirozeným způsobem potlačeny v růstu a postupně jsou nahrazovány domácími druhy.



V tomto místě byly před 5-7 lety akáty pokáceny na vysoký pařez. V prvních letech se odstraňováním výmladků z pařezu potlačil růst stromu a zejména jeho kořenových výmladků. Pařezy dnes již neobrážejí a svah zarůstá mladými nálety, ze kterých se podporují v růstu domácí druhy.







Svah byl v některých částech zejména podél cest v loňském roce vyčištěn, odstranilo se vše suché. Některé pařezy byly odstraněny úplně, jiné byly zakráčeny a ponechány jako sídlo pro hmyz. Prosvětlením porostu se objevilo na svahu bylinné patro.





Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí, proto po období běžné údržby Letenských sadů, přistoupil k revitalizaci území Letenských svahů. Revitalizací by se tato část území měla stát v souladu s územním plánem i požadavky ochrany přírody a funkčním územím, tj. měl by zde být i skutečně fungující územní systém ekologické stability s přihlédnutím k nutným estetickým požadavkům.

K tomu povede řada kroků, s jejichž realizací bylo započato na jaře 2005. Plocha Letenských svahů byla rozdělena do pracovních polí, kdy přednostně jsou a nadále budou odstraňovány stromy suché, nebezpečně nakloněné (zejména nad nábrežní komunikací) a také většina geograficky nepůvodních dřevin. Aby nebylo nutné používat velké množství biocidů zatěžujících životní prostředí, je aplikován přírodní způsob likvidace výmladků nepůvodních dřevin (zejména akátu a pajasanu) na vysokých pařezech. Po postupném odstranění nepůvodních dřevin a jejich výmladků by tyto měly nahradit výsadby stanovištěně vhodných domácích dřevin, jako je dub pýřitý (šípák), babyka, jeřáb břecký, jeřáb muk, hrušeň polní, třešeň ptačí, řešetlák, dřín a další. Předpokládá se, že práce budou probíhat postupně tak, aby veřejnost mohla jen s menším omezením nadále užívat cesty v Letenských svazích. Také větve a zbytky po těžbě dřeva budou v území ponechávány, částečně budou štěpkovány, další část zůstane na místě na hromádkách a bude vytvářet vhodné úkryty pro drobné živočichy (např. ježky) a hmyz. Některé suché a duté stromy nebudou pokáceny, ale bude z nich ponecháno torzo jako biotop pro hmyz a obratlovce. Současně poslouží jako podpora pro popínavé rostliny (jako např. plamének plotní nebo břečtan).



po odstranění akátů zůstávají domácí dřeviny





po odstranění akátů zůstávají domácí dřeviny